

定期予防接種（A 類疾病）の接種時期一覧

(注) 接種間隔の起算日は接種した日の翌日です。接種間隔は法令では日数で定められていますが、たとえば「1週間の間隔」というのは「1週間後の同じ曜日の日以降」と考えてください。

		1 か 月	出 生 0 日 後	2 か 月	3 か 月	出 生 6 日 後	4 か 月	5 か 月	出 生 0 日 後	6 か 月	7 か 月	出 生 0 日 後	8 か 月
ロタウイルス 感染症 (12頁参照)	経口弱毒生 ヒトロタウイルスワクチン (1価ワクチン)					↓							
	5価経口弱毒生 ロタウイルスワクチン (5価ワクチン)					↓			↓				

(※)：初回接種については、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間として接種します。

		3 か 月	6 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳
B型肝炎 (14頁参照)		↓	↓	↓																				
小児の肺炎球菌感染症 (16頁参照)		↓	↓	↓	↓																			
ジフテリア(D)・百日せき(P) 破傷風(T)・ポリオ(IPV) Hib感染症(18頁参照)	第1期 DPT・IPV・Hib	↓	↓	↓	↓																			
ジフテリア(D)・百日せき(P) 破傷風(T)・ポリオ(IPV) (18頁参照)	第1期 (DPT ・DT ・IPV)	↓	↓	↓	↓																			
Hib Hib感染症 (18頁参照)		↓	↓	↓	↓																			
ジフテリア(D) 破傷風(T) (18頁参照)	第2期 (DT)																							
BCG (25頁参照)		↓																						
麻しん(はしか)(M) 風しん(R) (MR・M・R)(27頁参照頁)					↓																			
水痘 (水ぼうそう) (30頁参照)					↓																			
日本脳炎 (32頁参照)																								
ヒトパピローマ ウイルス感染症 (34頁参照)	9価ワクチン																							

: 予防接種法で定められた対象年齢
 : 標準的な接種期間
 : 好ましい接種時期の一例

注1)：DTを第1期に接種する場合は、生後3月からとなります。
 注2)：平成7(1995)年4月2日から平成19(2007)年4月1日に生まれ、第1期、第2期の接種を受けられなかった人は、20歳未満であれば、定期接種として受けることができます。

妊婦を対象としたRSウイルス感染症

妊娠週数	...	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	...
RSウイルス感染症(母子免疫) (38頁参照)													

※妊娠28週0日から36週6日までの方が対象